

**10/01**VALÉRIO FERRERIA MALAQUIAS
NIVALDO CARRIJO OLIVEIRA
ORESTES VIOLA
EVANDO PEDRO DA SILVA
LILIA DA COSTA MACIEL
JOÃO BOSCO MIRANDA
HELOISIO CARNEIRO RODRIGUES**11/01**CAIOM KAULING
AILON VILELA RODRIGUES
VITOR GERALDO GAIARDO FILHO
ATAÍDES BARROS DA SILVA
EDÉSIO DA SILVA BARBOSA
ARLINDO DE RESENDE FRAGA
ANTÔNIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA
MÁRCIO LUCIANO DE VASCONCELOS
MÁRCIO FARIA DE RESENDE
NELIDIA SEVERINO DUTRA**12/01**ROBERTA CARVALHO RODRIGUES
SAMUEL SILVA DE CASTRO
ALENCAR JOSÉ DE SOUZA
EDOLI EBSSEN
ANTÔNIO CÂNDIDO ALVES
VALERIA SANTOS BORGES
FLÁVIO SILVA DOS REIS
MARILEIDE CAMPOS SOUSA**13/01**JOAO VITOR LOPES NUNES
GUSTAVO FERREIRA LEITE
ANTONIO CELIO MACHADO
ISMAEL BORGES CARRIJO
SEBASTIAO SEVERINO MACEDO
SELMA MARIA SILVA VILELA
LUISELTO REZENDE ARAUJO
SIRLENE DA COSTA LIMA FAVARO
SALVANI VILELA DE MORAIS**14/01**LUCIANA MARQUES OLIVEIRA
JOEL RODRIGUES REZENDE
LUIZ GUILHERME SANTANA NOVAES
JOSÉ LUCIANO SOBRINHO
VITORIA BARCELOS LEAL SIQUEIRA
JOSEMAR DALLA CORTE
AURITONIO CARLOS PEDRIEL GOUVEA
SORAYA FERREIRA RESENDE SILVA
MARCOS ANTÔNIO VILELA OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS GOUVEA
LAUDO TAVARES DE OLIVEIRA
HAMILTON APARECIDO VILELA BARROS**15/01**GABRIEL AMORIM MORAES
SIGLENE SILVA REZENDE
ESTALEIRO AGRO
ELZENICE ALVES OLIVEIRA
ROBSON RODRIGUES REZENDE
MARLI PAULINA SCHERER**16/01**ANA RODRIGUES PEREIRA
WASHINGTON PACHECO DE OLIVEIRA
PEDRO RODRIGUES DA SILVA
LOIS ALEXANDRE PAIVA FREITAS**17/01**EVERTON PIRES MACIEL
HITALO MARTINS NUNES
DIRCEU GRAEBIN
LUIZ RENATO ALMEIDA
ANTONIO VALDENIR MAZUREK

3 DICAS PARA UMA BOA COLHEITA DE SOJA

• Respeite o ciclo da cultura de soja:

Cada cultura apresenta um ciclo de desenvolvimento de cultivo diferenciado, o mesmo ocorre com a cultura da soja. As oleaginosas apresentam oito estágios, que começam no florescimento e vão até a maturação completa dos grãos.

O recomendado é colher quando a maturidade do grão atingir pelo menos 95% das vagens. Colher antes ou depois impacta diretamente na qualidade da commodity agrícola, além de interromper o desenvolvimento do cultivo.

• Observe o teor de umidade ideal:

Colher com a umidade acima ou abaixo do ideal pode comprometer toda a colheita dos grãos e causar diversas perdas na lavoura. Para evitar esta situação, é importante fazer a colheita da soja quando a oleaginosa atingir o teor de umidade entre 13% e 15%.

Mas como identificar o ponto certo de colheita? Não tem receita de bolo, mas o ideal é começar a analisar o teor de umidade das plantas 15 dias antes da data prevista para início da colheita. Neste caso, o produtor pode optar por fazer uma amostragem no talhão.

Além da análise, a coloração dos grãos é outro indicativo do teor de umidade. Quando os grãos de soja apresentam uma cor bronzeada, marrom ou cinza, é um indício de que a lavoura está pronta para ser colhida.

• De olho nas condições climáticas:

As variações do clima podem afetar o desenvolvimento da lavoura e causar inúmeros estragos nas plantações. Além disso, podem comprometer a eficácia das operações, como a aplicação de defensivos agrícolas e a colheita de soja.

Por isso, evite os períodos em que as temperaturas estão mais elevadas e opte por colher quando o clima estiver mais ameno e úmido, preferencialmente pela manhã. Outra dica importante é evitar climas adversos, como chuvas mais intensas e ventos fortes.

O clima tem forte impacto na lavoura e, nesta etapa da produção, todo o cuidado é pouco para evitar perdas quantitativas.

COLABORAÇÃO:

LARYSSA ANDRADE VIEIRA

Engenheira Agrônoma

Coordenadora Comercial de Insumos Agrícolas da COMIVA



IBAMA SUSPENDE CAUTELARMENTE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS À BASE DE FIPRONIL

O Ibama publicou no dia 29 de dezembro de 2023, comunicado para suspender, como medida cautelar, a aplicação de agrotóxicos à base de fipronil por meio de pulverização foliar em área total, ou seja, não dirigida ao solo ou às plantas. A medida visa a proteção aos insetos polinizadores até que o referido procedimento de reanálise do agrotóxico seja concluído pelo Ibama.

O fipronil, ingrediente ativo de vários agrotóxicos, encontra-se sob reavaliação ambiental pelo Ibama desde setembro de 2022, em razão dos indícios de efeitos adversos graves às abelhas associados ao uso desses agrotóxicos, observados em estudos científicos e relatados em diversas partes do mundo.

O comunicado justifica a suspensão com base no “direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e que a “proteção do meio ambiente auferida pelos princípios da precaução e da prevenção se dá com a implementação de medidas que possam prevenir a ocorrência de danos”.

Fonte: Mais Soja

FIQUE
POR
DENTRO

PRODUÇÃO:

Departamento
de Comunicação
da COMIVA

Site

www.comiva.com.br

CONTATO

☎ 64 3672.7023

☎ 64 9 9949.0915

REDES SOCIAIS

📺 📷 📱 COMIVA.GO