

**03/01**

LAURA MONIQUE VIANA RESENDE
MARIA ELISONIA SANTANA DOS SANTOS
MÔNICA SILVA RODRIGUES
MILTON MIRANDA MACEDO
ERASMO NOVAIS QUEIROZ
ELIAS TORQUATO DA SILVA
LEOMAIA DE OLIVEIRA SANTIAGO

04/01

MARIO JOSÉ RODRIGUES
JOÃO PIO SOBRINHO
ERONIDES JOSÉ DA SILVA
BELARMINO REZENDE VILELA
NELVO FRIES
EDILENE DELMONDES MOREIRA VILELA
DALTON FERREIRA PERES
GUSTAVO ROSAN
MARCELA MORAIS OLIVEIRA

05/01

WALDEMAR FERREIRA COSTA
QUINTILIANO FERREIRA PANIAGO
ANA MARIA MACHADO
FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
CELINA OLIVEIRA DOS SANTOS
JOSÉ ALVES PEREIRA
BRUNO JOSÉ DE LAURENTIZ
ALMIRO BRAZ DE FREITAS

06/01

EDITH MARIA DE RESENDE
DELCIDES TEODORO MARTINS
PAULO JÚNIOR CORREA FURQUIM
EURÍPEDES BARSANULFO FELIZARDO
LUIZ ANTÔNIO FREITAS MACEDO
RODRIGO DE SOUSA MAGALHÃES
JAIME ANDRÉ GUARESCHI
IVANILDA FRANCISCA DE RESENDE
LIANE CARNEIRO CARVALHO MARTINS
JOÃO PAULO BALZ FILHO
WENDER JUNIO ROSA
LEYNA FRIES

07/01

JOSÉ GERALDO VIEIRA
NILDA APARECIDA DE CARVALHO
SÁVIO RIBEIRO MOTA
FÁBIO TEODORO SILVA

08/01

HUGO ARAÚJO FERREIRA
CÍCERO RODRIGUES DE REZENDE
ADÃO ALVES BARCELO
ADÃO BATISTA MORAES SANTOS
RODRIGO CARVALHO CAMILO
TUYOSHI ONO
EMANUEL MESSIAS PEREIRA

09/01

ODACIR MARTINS SANTEIRO
SIRLEI DE CARVALHO REZENDE
LAURINDO AIMI
LUZIA EVANGELISTA VILELA BARBOSA
VALCIR ANTÔNIO DE MELO
FELIPE SANTOS MORAES
SÉRGIO VILELA MAIA

10/01

VALÉRIO FERRERIA MALAQUIAS
NIVALDO CARRIJO OLIVEIRA
ORESTES VIOLA
EVANDO PEDRO DA SILVA
LÍLIA DA COSTA MACIEL
JOÃO BOSCO MIRANDA
HELOÍSIÓ CARNEIRO RODRIGUES



DIARREIA EM BEZERROS

O sistema de produção em gado de corte possui um grande desafio que é o controle da diarreia em bezerros de 0 a 12 meses, a maior parte das doenças que acomete a produção no gado de corte acontece na fase de cria.

Agentes causadores de diarreia em bezerros:

Bactérias: (*Escherichia coli*; *salmonella* sp, *clostridium perfringens*);

Vírus: (*Rotavirus*);

Protozoários: (*Eimeria* sp);

Verminoses: (*trichostrongylus* axei; *haemonchus* sp; *ostertagia* sp; *trichuris* sp);

Fatores nutricionais (ingestão excessiva de leite ou rações similares).

Sinais Clínicos:

Desidratação;

Perda de peso;

Choque hipovolêmico;

Morte do animal.

Transmissão:

Água e alimentos infectados;

Condições precárias de higiene;

Alta densidade de animais;

Umidade excessiva, somado com altas temperaturas.

Tratamento:

Antibióticos e anti-inflamatórios;

Vacinação de fêmeas meses antes da parição

A **hidratação** de bezerro é de extrema importância.

COLABORAÇÃO:

WILKER RODRIGUES BARCELO
Médico Veterinário da COMIVA



**FIQUE
POR
DENTRO**



PRODUÇÃO:

Departamento
de Comunicação
da COMIVA

Site

www.comiva.com.br

CONTATO

☎ 64 3672.7023

☎ 64 9 9949.0915

REDES SOCIAIS

▶ f i c COMIVA.GO